

evOAK

Forward Thinking Oak Products

Oak chips (Classic evOAK)

Δοσολογία

Οι προτεινόμενες δοσολογίες αποτελούν ενδεικτικές τιμές και προτείνεται η πραγματοποίηση δοκιμών πριν την τελική εφαρμογή τους. Το στυλ του οινοποιού και τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας καθορίζουν τη δοσολογία.

Στην Αλκοολική ζύμωση

1,0–3,5 Kg/tn (γλεύκους), ή

0,5–2,0 Kg/metric tn (συνολική σταφυλομάζα, ερυθρή οινοποίηση)

Στην Ωρίμανση

0,6–2,0 Kg/tn οίνου

Συνιστώμενος χρόνος επαφής : έως 6 μήνες.

Σε περιπτώσεις σύντομου χρόνου επαφής ή αν ο οίνος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως οίνος βάσης σε κάποιο χαρμάνι, προτείνεται η χρήση υψηλών δοσολογιών (περί τα 2,0 Kg/tn).

Χρήση

Τα κλασσικά ρινίσματα δρυός μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε οινολογικό στάδιο. Κύριες δράσεις της χρήσης τους είναι η σταθεροποίηση του χρώματος, η ενίσχυση της δομής και της γεύσης. Μια άλλη οπτική είναι να προσδώσουμε συμπυκνωμένο εκχύλισμα από δρυ σε οίνο που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια σαν επιμέρους συστατικό σε κάποιο χαρμάνι.

Για τα **μικρού μεγέθους** ρινίσματα δρυός συνιστάται η χρήση κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης λόγω του γρήγορου ρυθμού εκχύλισης όσο της εύκολης χρήσης τους. Μετά την αλκοολική ζύμωση συνιστάται η προσθήκη μικρού ή μεγάλου μεγέθους ρινισμάτων σε ανοξείδωτες δεξαμενές με τη χρήση των ειδικών εμβαπτιζόμενων σάκων.

Χρόνος επαφής

Ο μέγιστος χρόνος επαφής είναι 6 μήνες κατά το στάδιο της ωρίμανσης και 1 μήνας στο στάδιο μετά την ωρίμανση.

Σε περίπτωση που τα χρονικά περιθώρια κατεργασίας είναι περιορισμένα, προτείνεται η αύξηση των παραπάνω δοσολογιών.

Αριθμός χρήσεων: 1 χρήση