

DEPECTIL AR

Σύνθεση πηκτινολυτικών και άλλων ενζύμων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χάρη στην ειδική ενζυμική του σύνθεση, το **DEPECTIL AR** επιτρέπει τη βελτίωση του οίνου :

- διευκολύνοντας τη διαύγαση του γλεύκους,
- διευκολύνοντας το φιλτράρισμα,
- αυξάνοντας το ποικιλιακό άρωμα με την απελευθέρωση αρωματικών τερπενολών, που προέρχονται από τις πρόδρομες αρωματικές ενώσεις (τερπενικοί γλυκοζίτες).

Οι πιο πολλές ποικιλίες, αρωματικές ή μη, περιέχουν ένα μεγάλο μέρος των αρωματικών συστατικών τους υπό τη μορφή γλυκοζιτών, τα οποία είναι περισσότερα από τα ελεύθερα. Αναλύσεις των γλυκοζιτών έδειξαν ότι τα ποσοστά ποικίλουν από ποικιλία σε ποικιλία. Το **DEPECTIL AR** με την ειδική του σύνθεση, επιτρέπει την απελευθέρωση των αρωματικών συστατικών από τις πρόδρομες ενώσεις τους.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

- **Συνιστώμενη δοσολογία : 50 - 100gr/tn**
- **Μέγιστη δοσολογία : 100 gr/tn**

Η μέγιστη δοσολογία εφαρμόζεται στους γλυκείς οίνους. Αφήστε να δράσουν 2 με 3 εβδομάδες. Η χρήση του **DEPECTIL AR** στις ερυθρές ποικιλίες είναι ακόμη στο στάδιο της έρευνας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε το **DEPECTIL AR** σε οίνο ή νερό σε αναλογία 50 gr/L Αναμίξτε με τον προς κατεργασία όγκο προς το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης εξασφαλίζοντας καλή ομογενοποίηση.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ +4°C και +8°C μέχρι την ημερομηνία λήξης. Ανοικτή συσκευασία τοποθετείται στο ψυγείο και πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείτε το μπεντονίτη ταυτόχρονα με τα ένζυμα διότι αυτά απορροφώνται από το μπεντονίτη. Χρησιμοποιείτε το μπεντονίτη περίπου 1 ώρα μετά τα ένζυμα.

- Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας.
- Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι επιβεβλημένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
- Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφη άδειά μας.



ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ